Institut de cancérologie Gustave Roussy

Histoire naturelle du cancer du sein: prédisposition, susceptibilité en réponse à l'irradiation

Dr. Sofia Rivera, Dr Suzette Delalogue

Journée « faibles doses » 19/03/2013

Institut de cancérologie
GUSTAVE ROUSSY
VILLEJUIF - www.igr.fr

→ Le Cancer du Sein

- ✓ 1^{er} cancer chez la femme:
 - ✓ 53000 nouveaux cas/an actuellement en France
 - ✓ une femme sur 9
 - ✓ en moyenne à 60 ans
- ✓ 1^{ère} cause de décès par cancer chez la femme: > 11000/an en France

Survie relative à 5 ans (diagnostic en 1990-1994) et nombre de cas en 2002

Fig. 4 – Incidence du cancer du sein par age

L'incidence augmente,
surtout après 50 ans

Mortalité pour les cancers fréquents, Femmes

La mortalité baisse:
-Dépistage et diagnostic précoces
-Traitements adjuvants

→ Risque de rechute à 10 ans si
cancer de 2 cm, grade 2, 60 ans,
RE+ RP+ Her2- N-?

1. 10%

2. 25%

3. 50%

4. 70%

- Home
- Messages
- Breast Cancer
- Colon Cancer
- Prostate Cancer
- Resect
- Downloads
- Resources
- Personal Info
- Logout
- Advanced Use
- Contact Us

Adjuvant! Online

Decision making tools for health care professionals

Adjuvant! for Breast Cancer (Version 8.0)

Patient Information

Age:

Comorbidity:

ER Status:

Tumor Grade:

Tumor Size:

Positive Nodes:

Calculate For:

10 Year Risk:

Adjuvant Therapy Effectiveness

Horm:

Chemo:

Hormonal Therapy:

Chemotherapy:

Combined Therapy:

→ Risque de décès par cancer à 10 ans si cancer de 2 cm, grade 2, 60 ans, RE+ RP+ Her2- N-?

1. 8%

2. 15%

3. 25%

4. 30%

- Want! Home
- essages
- st Cancer
- n Cancer
- g Cancer
- esect
- loads
- Resources
- onal Info
- ut
- ded Use
- act Us

Adjuvant! Online

Decision making tools for health care professionals

Adjuvant! for Breast Cancer (Version 8.0)

Patient Information

Age:

Comorbidity:

ER Status:

Tumor Grade:

Tumor Size:

Positive Nodes:

Calculate For:

10 Year Risk:

Adjuvant Therapy Effectiveness

Horm:

Chemo:

Hormonal Therapy:

Chemotherapy:

Combined Therapy:

→ Survie spécifique à 10 ans

- **20% lorsqu'il existe des métastases d'emblée au diagnostic**
- **90% lorsque le diagnostic est fait à un stade localisé**

Expression des gènes: Le cancer du sein n'est pas une entité unique : portraits moléculaires

→ EPIDEMIOLOGIE DES CANCERS DU SEIN

Répartition des sous types de cancer du sein

→ EPIDEMIOLOGIE DES CANCERS DU SEIN

❖ Incidence en fonction de l'âge des cancer RH+ et RH-

A: SEER 13 Registries (1992-2007)
n = 401,695 total cases

B: SEER RTR (1995)
n=354 total cases

→ Risque annuel de rechute métastatique

40. Dent R, Trudeau M, Pritchard KI, et al. Triple-negative breast cancer: clinical features and patterns of recurrence. Clin Cancer Res 2007;13:4429-34.

→ PARTICULARITÉS CLINIQUES DES TRIPLE NÉGATIFS

- ❖ Âge jeune au diagnostic (< 40ans, principalement avant la ménopause), profil ethnique
- ❖ Stade avancé au diagnostic
- ❖ Pronostic plus sombre que les autres types de cancer du sein
- ❖ Pic d'incidence des récurrences entre 1 et 3 ans après le traitement qui décroît ensuite rapidement (taux de récurrence quasi nul au-delà de 8ans), 84% viscérales

→ PARTICULARITÉS BIOLOGIQUES DES TRIPLE NÉGATIFS

- ❖ Entité hétérogène
- ❖ Profil immuno-histochimique basal like (75%) associé à un pronostic plus sombre que les autres triple négatifs:
 - ❖ Triple négatif, CK5/6+, CK14+, CK17+, EGFR+, CD117+ (=C-kit)
- ❖ Majorité de carcinomes canauxaires infiltrants mais aussi médullaires anaplasiques, adénoïdes kystiques, carcinomes métaplasiques...
- ❖ 80-90% des cancers BRCA1 mutés sont des triple négatifs
- ❖ Pas d'association triple négatifs-BRCA2mutés

→ PARTICULARITÉS GÉNÉTIQUES DES TRIPLE NÉGATIFS

- ❖ Les techniques de profil d'expression génique ont permis de mettre au point différentes signatures à visée pronostique et prédictive

→ Facteurs de risques

- ✓ **Hormonaux (imprégnation oestrogénique)**
 - Règles précoces (≤ 11)
 - Ménopause tardive (> 55)
 - Parité faible , 1ère grossesse > 30
 - Absence d'allaitement
 - Contraception prolongée?
 - Traitement hormonal substitutif
 - Antécédents de biopsie mammaire
 - Hyperoestrogénie relative (surcharge pondérale, excès d'alcool et de graisses, absence d'exercice physique)

Chacun augmente de façon mineure le risque

→ Facteurs de risques

✓ Autres:

→ Radiothérapie thoracique (Hodgkin)

→ ATCD personnel de cancer du sein

→ Antécédents familiaux +++

→ RISQUES DE CANCERS SEIN/OVAIRE

→ Dépistage organisé

- Réduit la mortalité de 20-30% chez les femmes >50ans si taux de réponse > 70%
- En France depuis 2003
- De 50 à 74 ans, « gratuit »
- Mammographie tous les 2 ans, bilatérale ≥ 2 incidences avec examen clinique et double lecture!!
- Taux de réponse actuel: dépasse 52,7% (bcp de dépistage individuel)

Classification BIRADS de l'ACR

- ▶ Etablie par l'American College of Radiology
- ▶ Système de compte-rendus :
 - Termes choisis : lexique BIRADS
 - Base de données
 - Evolutivité
- ▶ Assurance-qualité

ACR 1: seins normaux sans anomalies

ACR 2:

seins normaux avec anomalie(s) 100%
bénignes

FIBROADENOME CALCIFIE

ACR 3:

Présence d'une anomalie
vraisemblablement bénigne (97%) à
recontrôler pour affirmer la bénignité

Microcalcifications lobulaires bénignes

ACR 4:

Présence d'une anomalie d'allure suspecte
(20-60% = cancer)

Cancer intracanalalaire

ACR 5:
Anomalie très suspecte
(> 95% = cancer)

Cancer canalaire infiltrant + kyste

→ Impact du dépistage

Evaluation du
dépistage:
Base SEER
Femmes ≥ 40 ans
De 1976 à 2008

Doublement des
diagnostics à un
stade précoce
Réduction de 8%
des diagnostics à
un stade avancé

→ Impact du dépistage

Table 2. Four Estimates of the Excess Detection (Overdiagnosis) of Breast Cancer Associated with Three Decades of Screening Mammography, 1979–2008.

Estimate	Assumption Regarding Underlying Incidence of Breast Cancer	Surplus in Diagnoses of Early-Stage Disease	Reduction in Diagnoses of Late-Stage Disease	Excess Detection
			<i>number of women</i>	
Base case	It was constant	1,585,000	67,000	1,518,000
Best guess	It increased at a rate of 0.25%/yr*	1,507,000	138,000	1,369,000
Extreme assumption	It increased at a rate of 0.5%/yr†	1,426,000	213,000	1,213,000
Very extreme assumption	It increased at a rate of 0.5%/yr and baseline incidence of late-stage disease was the highest ever observed‡	1,426,000	410,000	1,016,000

* This increase in incidence was observed among women younger than 40 years of age.

† This increase in incidence was twice that observed among women younger than 40 years of age.

‡ The peak in the incidence of late-stage breast cancer was 113 cases per 100,000 women in 1985.

Surdiagnostic estimé à 31% des cancers diagnostiqués

Mais:

quelle population? Quelle compliance? Quelle technique?

→ Risques liés aux faibles doses

- Etude rétrospective chez 1601 femmes présentant une mutation BRCA1/2
- Risque de cancer du sein corrélé à la dose d'irradiation et à l'âge d'exposition à l'irradiation

Table 4. Weighted Cox Regression Analysis of Combined X-Ray Exposure in the Pseudo-Incident Cohort With Follow-Up Beginning 5 Years Before the Interview (United Kingdom/Ireland data excluded)

Exposure	No. of Person-Years	No. of BC	HR*	95% CI
Age at x-ray exposure				
Never exposed	773	28	1.00	
Before age 20 years only	137	12	5.21†	1.6 to 17.5
After age 20 years only	256	26	1.91	0.9 to 4.1
Before and after age 20 years	978	88	1.98‡	1.1 to 3.7
Level of x-ray exposure				
Never exposed	773	28	1.00	
At least one period with 1-4 x-rays and no period with 5+ x-rays	705	50	1.76	0.9 to 3.4
At least one period with 5+ x-rays	666	76	2.69†	1.4 to 5.3

Abbreviations: BC, breast cancer; HR, hazard ratio.

*Adjusted for parity and oophorectomy (yes v no) and stratified by country group and birth cohort.

† $P < .01$.

‡ $P < .05$.

→ Risques liés aux fortes doses

- 5002 femmes
- Irradiées en sus diaphragmatique <36 ans entre 1956 et 2003
- Risque accrue de cancer du sein persistant sur au moins 40 ans

Table 3. Risk of Breast Cancer by Age and Type of Treatment

Age at First Supradiaphragmatic RT (years)	Supradiaphragmatic RT Only						Supradiaphragmatic RT Plus Alkylating CT and/or Pelvic RT					
	Observed	Expected	SIR	95% CI*	AER	95% CI*	Observed	Expected	SIR	95% CI*	AER	95% CI*
0-9	0	0.1	0.0	0.0 to 63.4	-1.3	-1.3 to 80.0	1	0.1	16.8	0.4 to 93.7	26.4	-1.0 to 155.0
10-14	11	0.5	21.2	10.6 to 38.0	77.6	36.8 to 141.9	12	0.5	24.7	12.8 to 43.2	59.5	29.5 to 105.7
15-19	45	3.1	14.5	10.6 to 19.4	60.5	42.9 to 82.5	56	3.7	15.0	11.3 to 19.4	56.8	41.9 to 74.9
20-24	48	6.8	7.0	5.2 to 9.3	43.2	30.0 to 59.6	37	8.9	4.2	2.9 to 5.8	20.8	12.7 to 31.1
25-29	30	7.8	3.9	2.6 to 5.5	29.5	16.6 to 46.6	33	10.9	3.0	2.1 to 4.3	19.2	10.3 to 30.7
30-35	28	8.6	3.3	2.2 to 4.7	33.8	17.4 to 55.5	23	12.4	1.9	1.2 to 2.8	11.5	2.3 to 23.9
<i>P</i> heterogeneity			< .001			.013			< .001			< .001

Abbreviations: AER, absolute excess risk per 10,000; CT, chemotherapy; RT, radiotherapy; SIR, standardized incidence ratio.

*All SIRs and AERs with CIs not including 1.0 are significant at $P < .001$.

→ **Le dépistage standard est-il adapté à toutes?**

NON: environ 10-15% des femmes relèvent de mesures de dépistage individualisé

- **Risques moyens (15-30%):** examen clinique annuel dès 30 ans, mammographie annuelle à partir de 40 ans? (pas de recommandations officielles)
- **Risques très élevés:** il existe des recommandations

→ Prédilection et susceptibilité

sur 100 cancers du sein

Prédilection:

- 4-5%
- Monogénique
- Autosomique dominant
- Forte pénétrance

Susceptibilité:

- 15%
- Multigénique
- Faible pénétrance

→ Prédiposition: transmission

Tout apparenté au premier degré a **50%** de risque d'être porteur

→ Quels gènes en cause?

	% cancers du sein	Risque de cancers
BRCA1	2,5%	Sein, ovaire (prostate, autres)
BRCA2	2%	Sein, ovaire, pancréas, mélanome, sein chez l'homme
p53	<0.5%	Sein jeune ++, Sarcomes, TC, corticosurrénales, LA, etc
Autres (PTEN, etc)	Rare ++	

→ Consultation d'oncogénétique: indications

- **3 atteintes de cancer du sein/ovaire 1er/2nd degré, même branche parentale**
- **2 atteintes au 1er degré (ou 2nd si paternel) si l'un des 2 est < 40 ans ou bilatéral (sein)**
- **2 cancers ovaire 1er degré (ou 2nd si paternel)**
- **Cancer du sein + ovaire, cancer du sein masculin, cancer du sein < 35 ans**

→ Dépistage des populations à risque élevé

- **IRM annuelle dès 25-30 ans**
- **Chez les femmes BRCA1/2 mutées**
- **Chez les femmes préalablement irradiées en sus diaphragmatique**
- **Modalités en cours d'évaluation**

→ Conclusions

- Principe ALARA
- Optimisation, justification
- Ne pas sous estimer le bénéfice du dépistage organisé
- Mammographie double incidence, double lecture standard actuel recommandé chez les femmes de 50 à 74 ans tous les 2 ans.