Modulation de l'activité cérébrale pendant une tâche de tapping après exposition à un champ magnétique de $3000 \mu\text{T}$ à 60 Hz

Alexandre Legros

alegros@lawsonimaging.ca

Bioelectromagnetics Group, Imaging Program, Lawson Health Research Institute
and

Department of Medical Biophysics, University of Western Ontario,
London (ON), Canada

L'équipe du Lawson:

Dr. Jodi E. Miller^{1,2}

Nicole Juen^{1,2}

Dr. Julien Modolo^{1,2}

Dr. Jean Théberge^{1,2}

Michael Corbacio^{1,2}

Dr. Frank S. Prato^{1,2}

John R. Robertson^{1,2}

Dr. Alex W. Thomas^{1,2}

Collaborateurs:

Dr. Daniel Goulet³

Dr. Jacques Lambrozo⁴

Dr. Michel Plante³

Dr. Martine Souques⁴

Dr. Anne Beuter⁵

¹Bioelectromagnetics, Imaging Program, Lawson Health Research Institute, London (ON) Canada
²Department of Medical Biophysics, University of Western Ontario, London (ON) Canada

³Hydro-Québec, Montréal (QC) Canada

⁴Service des Études Médicales, EDF, Paris France

⁵Institut polytechnique de Bordeaux, France

Sources de financement

- **Champs Magnétiques d'Extrêmement Basse Fréquence (CM ELF) - Humain**

Courants domestiques
alternatifs 50/60 Hz

CM à 50/60 Hz (ELF < 300 Hz)

Induction de champs et
courants électriques
dans les systèmes
biologiques

- Des études suggèrent qu'un CM ELF pourrait moduler les rythmes cérébraux et les fonctions cognitives et motrices chez l'humain:
 - Électroencéphalogramme (EEG^{1,2}) et potentiels évoqués³
 - Performances cognitives (attention sélective³, raisonnement syntactic ⁴, vigilance⁴, mémoire de travail⁵)
 - Activité motrice normale (contrôle postural^{6,7} et tremblement physiologique^{7,8})

¹Cook et al., *Bioelectromagnetics* (2004)

²Ghione et al. *Neuroscience Letters* (2005)

³Crasson et al., *Bioelectromagnetics* (1999)

⁴Stollery et al., *Br J Ind Med* (1986)

⁵Preece et al., *Int J Radiat Biol* (1998)

⁶Thomas et al., *Neuroscience Letters* (2001)

⁷Legros et al., *REE* (2010)

⁸Legros et al., *Med Eng and Phys* (2006)

- Neurones: transportent de l'information sous forme de signaux électriques
- Chaque neurone a en moyenne 10 000 connexions synaptiques avec d'autres neurones

- 10^{11} (100 milliards) neurones

- IRMf: mesure l'activation cérébrale induite par une tâche

Arthurs *et al* 2002

TRENDS in Neurosciences

- Tâche de tapping simple: activation controlatérale des **aires motrices primaire et supplémentaire (M1 et SMA)**, du **cortex prémoteur** et du **cervelet**¹.

¹Toma *et al.*, *Magn Reson Med Sci* (2002)

- Étude pilote à 60 Hz, 1800 μ T: activation post exposition réduite en SHAM et pas en EXPO¹

1. Pré exposition: TOUS les sujets(n=9)

2. Post moins Pré SHAM (n=5)

Désactivation dans le cortex somatosensory primaire (S1)

3. Post moins Pré EXPO (n=4)

Aucune sur activation de S1 n'est relevée

¹ Legros et al., Neuroscience letters (soumis)

Objectifs

- Confirmer que l'IRMf est un outil adapté pour étudier la modulation des patrons d'activation cérébrale par une exposition ELF
- Confirmer les résultats de notre étude pilote

Hypothèse

- L'exposition au CM à 60 Hz, 3000 μ T va entraîner une augmentation du niveau d'activation cérébral (cortex moteur et cervelet) induit par la tâche de tapping réalisée à fréquence naturelle

- 20 sujets (25 ± 5 ; 10 femmes and 10 hommes)
- IRM - 3 T Verio (Siemens)
- Images fonctionnelles (Blood Oxygen Level Dependent-BOLD) pendant une tâche rythmique d'opposition index/pouce à fréquence naturelle
- 2 groupes: SHAM (n=11) et EXPO (n=9), procédure en pseudo double aveugle

- 1 session expérimentale, 3 tests avant et 3 tests après 1 heure de repos

- Les sujets n'ont pas détecté l'exposition à 60 Hz (FSQ: $\chi^2=3.23$, $p > .05$; niveau de certitude = 2 out of 5)
- Pas de changement significatif du rythme (ANOVA 2x2; $p > .1$) ni de la variabilité ($p > .2$) du tapping - tendance
- Activation induite par la tâche (Brain Voyager QX 1.9.10, Brain Innovation, the Netherlands):
 - Activation controlatérale du cortex prémotor, de M1, SMA et S1
 - Activation ipsilatérale du lobe antérieur du cervelet

Cortex moteur – 20 Sujets

(Normalisé dans l'espace de Talairach - GLM multisudy analysis, Brain Voyager, $p < .001$)

1. Pré exposition TOUS les sujets (n=20)

2. Post moins Pré SHAM (n=11)

3. Post moins Pré EXPO (n=9)

Plus d'activation dans S1

Cervelet – 20 Sujets

(Normalisé dans l'espace de Talairach - GLM multisudy analysis, Brain Voyager, $p < .001$)

1. Pré exposition TOUS les sujets (n=20)

2. Post moins Pré SHAM (n=11)

3. Post moins Pré EXPO (n=9)

Niveau d'activation augmenté dans le lobe antérieur du cervelet (ipsilatéral)

Results

- « Beta weights » extraits des Régions d'Intérêt (ROI) pour tests statistiques classiques (ANOVAs 2x2 in SPSS): Effet d'interaction significatif pour S1 ($F=4.060, p=0.05$) et le cervelet ($F=31.626, p < 0.001$)

- Tâche rythmique d'opposition index/pouce: activations **controlatérales** du **cortex moteur (M1, SMA, S1)** et **prémoteur**; et **ipsilatéral** du **cervelet** (n=20)
- **Pas de différence** d'activation induite par la tâche entre les conditions pré et post repos (**SHAM**, n=11)
- **Activation** induite par la tâche **plus élevée** après une heure d'exposition au CM (relatif au niveau d'activation pré exposition - **REAL**, n=9) dans **S1** et dans le **cervelet**
- Résultats **cohérent** avec notre **étude pilote**: activation impliquée après 30 minutes d'exposition augmentée quand comparée à la condition SHAM

- Ces résultats démontrent que l'IRMf est un outil valide pour étudier les effets des CM ELF sur les fonctions cérébrales
- S1: associée avec la stimulation haptique¹ (i.e. sens tactile); Cervelet: optimise le mouvement en utilisant le feedback sensoriel

- Exposition au CM induit une réduction spontanée de la variabilité du rythme de tapping (tendance non significative)

- Nous spéculons que l'exposition au CM pourrait induire des changements plastiques détectés par la procédure IRMf

¹Johansen-Berg et al., *Neuroreport* (2000)

²Allen et al., *Science* (1997)

- Confirmer ce résultat en utilisant d'autre modalité d'imagerie: IRMf/EEG/TEP
- Développements de protocoles **établissant un seuil** auquel des effets systématiques se manifestent chez l'**humain**:
 - Exposition globale et locale, continues et intermittentes, pouvant atteindre 50 000 μ T
 - Étude des magnétosphènes, EEG, IRMf, potentiel évoqués (ERP), électromyographie (EMG) et réponses motrices (tremblement et posture) à une exposition aigue à un CM ELF

fMRI

Physiological tremor

EEG and ECG

Merci

alegros@lawsonimaging.ca

Postural Oscillations

Voluntary movements

3 000 μ T human exposure

Blood Perfusion

system

a.

c.

b.

d.

- The tapping protocol: