IRSN

INSTITUT
DE RADIOPROTECTION
ET DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

Faire avancer la sûreté nucléaire

Existe-t-il une corrélation entre
l'augmentation du dépôt d'énergie
à la lumière de l'artère coronaire
et la concentration de l'iode
dans les agents de contraste ?

Projet de collaboration_CHU Henri Mondor

**Alan Dil BOODHUN, Nora HOCINE, Hélène MASSET, Michel MEIGNAN &
Didier FRANCK**

Lille, le 8 juin 2017

Sommaire

- Motivation
- Matériels et méthodes
- Résultats
- Conclusions
- Perspectives

Resténose précoce (Pb): Motivation

- Tx **élevé** de resténose est observé après pose d'un stent
- 36-40 % des patients récidive (sténose) 6 mois après une angioplastie

Holmes DR et al. (1984) Am J Cardiol

Rappels- Maladie des artères (coronaires)

Diseased Artery

- ☞ Artère coronaire rétrécie par l'accumulation graisse
- ☞ Accumulation de la graisse Pb appelé= Athérosclerose

Maladie coronarienne - Athérosclérose ?

Notions médicales

↳ Dépôt de plaque composée de lipides (athérome) sur paroi des artères entraîne une lésion de la paroi artérielle (sclérose)

↳ Obstruction (occlusion du vaisseau) ou à rupture

Qu'est-que l'angioplastie (+stent)?

Notions médicales

- ☞ Cathéter (long tube flexible) introduit dans un vaisseau sanguin acheminé (S/Contrôle RX) à l'artère coronaire rétrécie (plaque).
- ☞ Le ballonnet (couvert d'un stent: petit ressort en métal) gonflé comprime la plaque et dilate le stent.
- ☞ le ballonnet retiré, stent demeure à l'intérieur de l'artère pour la maintenir ouverte et rétablir circulation.

Le stent-Infos ? Stent actif ou nu? *Notions médicales*

□ Stent (rappel définition)= petit ressort en métal, placé dans les artères pour éviter qu'elles ne se bouchent

□ 2 Types:

Pharmaco-actif:

- recouvert d'une substance antiproliférative qui diminue le risque de sténose

Nu:

- Sans médicaments

☞ Le choix est effectué en fonction des caractéristiques individuelles (chaque patient)

Impact des PCI & But de l'étude

- Le suivi des patients réalisé par angiographies répétées (+utilisation de PCI)
- ☞ Les cliniciens s'interrogent sur la probable influence des PCI sur l'augmentation de la fréquence des récurrences de sténoses coronariennes ?

■ Objectif projet ?

- Mieux comprendre le rôle possible des PCI sur la paroi des artères coronaires
- ☞ Existence de corrélation entre présence d'Iode (# concentrations) & l'énergie déposée dans la lumière de l'artère coronaire?

Matériels and méthodes (1)

I- Mesures de doses:

- Fantôme tronc
- Tubulure (plastique) & éprouvette
- TLD-700, détecteur Unfors EDD-30
(3.2 mm x 3.2 mm x 0.15 mm)
- Tube RX à # E: 70kV (44keV); 80kV (48keV) ; 90 kV (52keV); 100 kV (55 keV)
- # Concentration (I-127): 0; 80; 160; 240; 320, 400 mgI/mL

II- Calculs de l'énergie déposée

- MCNPX (2.6 c version) and PENELOPE (2014)
  - Energie déposée dans la lumière de l'artère
(# Energies et # concentrations d'Iode)

Géométrie de la modélisation (1)

3D- A trunk phantom and the vessel
(surrounded by dashed lines)

2D modelised trunk phantom and vessel

Géométrie de la modélisation (2)

Géométrie de la modélisation (3)

Structures entourant l'artère coronaire

☞ Impact de l'I sur les poumons-cœur

Résultats (1): Mesures $H_p(0.07)$ avec le détecteur Unfors EDD-30

$H_p(0.07)$ en fonction de l'énergie pour différentes concentrations de PCI à la paroi de la tubulure

Résultats (2)

Validation du code MC MCNPX

- ☞ Validation MCNPX par comparaison avec PENELOPE (version 2014)
- ☞ Un T. Accord observé entre les valeurs des E. déposées dans lumière de l'AC calculées avec les codes MC MCNPX and PENELOPE

Résultats (3) - Impact de l'I sur l'énergie déposée dans la lumière de la coronaire

↳ Energie déposée augmente avec la concentration de l'I et l'E (44-55 keV)

Résultats (4) - Impact du stent sur la dose déposée dans la lumière de l'artère?

Dose deposited in the coronary artery Stent (+) vs Stent (-)

☞ Pas d'effet significatif du Stent (AISI316L) noté dans cette étude

Résultats (5): Facteur d'Amplification d'Energie (FAE)

☞ Rapport du dépôt E en (+) et (-) ☞ FAE dépend de l'énergie photons X et I-127 ☞ La + haute valeur est =25 pour 400 mg I/mL et 83 keV

Résultats (6) - Propagation des particules dans le fantôme-PENELOPE (2014)

Conclusions

- Mesures réalisées montrent une augmentation du H_p (0.07) à la paroi avec l'énergie du fx et la concentration de l'iode
- Une corrélation est **observée** entre l'augmentation de la quantité d'iode (I) et l'énergie (E) déposée dans la lumière de l'artère coronaire pour les E utilisées en imagerie vasculaire et cardiaque
- FAE varie en fonction des E des fx de RX et de la concentration d'I utilisées, valeur maximale pour E=83 keV .
- Aucun impact de la présence du stent (AISI 316L) n'a été mis en évidence pour la gamme d'énergies étudiées.

PERSPECTIVES

- Expérimentations (culture cellulaire):

L'étude de la radiosensibilité cellulaire des cellules endothéliales en présence de l'ode

- 👉 Observer l'effet des PCI sur la survie cellulaire
- 👉 Mieux comprendre le possible effet causal des PCI sur la resténose précoce ?

Merci de votre attention &
prenez soin de vos artères !